ANTIBODY FOR CANCER MARKER

Glioma

Lung Cancer

Thyroid Cancer


Pancreatic Cancer

Colorectal Cancer

Stomach Cancer

Ovarian Cancer

Prostate Cancer

Bladder Cancer

kidney Cancer

Melanoma


Blood Cancer

購買100μg 或100μl 抗體2支

再享好禮2選1

Protein Marker
#XR-LSB-PM2500-1SET

或

BCA 定量套組
#XR-LBC03-100

DM11407011

友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699 FAX:(02)2600-0799
◆新竹 TEL:(03)658-0508 FAX:(03)658-0509
◆台中 TEL:(04)2355-2008 FAX:(04)2355-2006
◆嘉義 TEL:(05)277-2262 FAX:(05)277-2263
◆台南 TEL:(06)249-5488 FAX:(06)249-5499
◆高雄 TEL:(07)374-8686 FAX:(07)374-8585
◆花蓮 TEL:(03)836-0065 FAX:(03)836-0075
www.uni-onward.com.tw

癌症轉移相關的生物標記

癌症轉移是指從原發腫瘤轉移到遠處組織或器官，此過程是癌症發病率的一個重要因素之一，也是惡性癌症的特徵。IHC 在預測癌症、腫瘤轉移的判讀對於早期個人化治療癌症非常重要。因此癌症轉移的生物標記能夠幫助檢測轉移的早期階段、癌症轉移的首選部位以及癌症復發的風險。

Target	品號	應用	描述
ABL1	HPA027251 HPA027280	IHC IF, IHC	ABL1 蛋白是一種酪氨酸激酶，在癌症轉移中扮演著複雜的角色
CHD1	HPA004812	IHC	CHD1蛋白是參與染色質重塑的蛋白質，基因表現與癌症轉移有關聯，尤其是在前列腺癌症中
FOS	F7791	IHC, WB	是一種轉錄因子，在細胞增殖、分化和凋亡中扮演重要角色，FOS 的過度表現或異常活化與多種腫瘤的轉移有關。
MMP2	HPA001939	IHC, WB	是一種金屬蛋白酶2，在癌症轉移中扮演著關鍵角色，主要通過降解細胞外基質，促進腫瘤細胞的浸潤和轉移
PAK4	WH0010298M1	WB, ELISA	PAK4 蛋白的表現增加，與多種癌症的轉移、存活率降低以及其他不利的臨床指標顯著相關。
ROCK1	HPA007567	IHC, WB	ROCK1在腫瘤微環境的動態變化中發揮作用，例如: 影響細胞外基質的僵硬性，從而促進腫瘤的生長和轉移。
STAT3	HPA001671	IHC, IF, WB	是一種在癌症轉移中發揮重要作用的蛋白質，透過調節細胞增殖、存活、遷移和侵襲，來促進腫瘤細胞的轉移。
PEG10	HPA029915 HPA051038	IHC IHC, IF	其基因的表達，與多種癌症的惡性轉移有關
FAT1	HPA023882	IHC	FAT1基因功能的喪失，促使腫瘤細胞發生EMT，使細胞失去原有的極性和黏附性，更容易從原發腫瘤脫落並轉移到其他部位。



Anti-ABL1 HPA027280



Anti-CHD1 HPA004812



Anti-FOS F7791



Anti-MMP2 HPA001939



Anti-PAK4 WH0010298M1



Anti-ROCK1 HPA007567



Anti-STAT3 HPA001671



Anti-PEG10 HPA051038

各種癌症的生物標記

癌症	Target Protein	品號	應用	包裝
乳腺癌	Estrogen Receptor α	06-935	ICC, IHC, IP, WB	100 µg
	Progesterone Receptor	SAB4502184	ICC, IHC, ELISA	100 µg
		SAB5500165	IHC	100 µl
乳腺癌,卵巢癌, 前列腺癌	BRCA1	07-434	WB, IP, IHC	100 µl
		MABC199	WB, ICC	100 µg
		OP92	WB, IF, IP, IHC	100 µg
乳腺癌,卵巢癌,前列腺癌	BRCA2	OP95	WB, IP	100 µg
前列腺癌	PSA	SAB4501531	IHC, WB	100 µg
子宮內膜癌	PTEN	SAB2501614	WB, ELISA	100 µg
		SAB1404272	WB, IF, IP, ELISA	100 µg
		04-035	IHC, IP, WB	100 µg
		P3487	WB, ICC, ELISA	200 µl

癌症	Target Protein	品號	應用	包裝
肺癌	EGFR	E3138	IHC, IP, WB, ELISA	100 µl
		06-847	WB, IP	25 µg
		HPA018530	IHC, ICC, WB	100 µl
	ALK	HPA010694	IHC, ICC	100 µl
	ROS1	SAB1300020	IHC, WB, ELISA	100 µg
肺癌, 甲狀腺癌	RET	SAB5300387	WB, ELISA	100 µl
肺癌, 腎癌	MET	SAB4300599	WB, IHC	100 µg
肺癌, 膀胱癌, 腎癌	PD-L1	MABC1115	IHC, ICC, WB	100 µl
膀胱癌	FGFR3	SAB4500888	WB, IHC, ELISA	100 µg
腎癌	VHL	SAB4503075	IHC, ELISA	100 µg
		ZRB2230	WB, IHC, IF	100 µg
	BAP1	WH0006045M1	WB, ELISA	100 µg
		PLA0248	WB, IP	100 µl

EGFR	幫助細胞生長和分裂的受體蛋白, 在正常狀態下，EGFR 調節細胞生長。然而，EGFR 的突變會導致細胞不受控制地生長，進而導致癌症。 EGFR突變常見於肺癌
ALK	ALK 有助於調節神經細胞的生長和發育。然而，ALK 基因的重排可能導致癌症，尤其是肺癌
ROS1	參與細胞生長的受體酪胺酸激酶，ROS1 基因的重排可能導致癌症的發展，尤其是肺癌。
RET	是一種在細胞訊號傳導和生長中發揮作用的基因，RET 基因的突變或重排可能導致癌症，特別是甲狀腺癌和肺癌
MET	是一種受體酪胺酸激酶，在細胞生長和存活中發揮作用。MET 的基因擴增或突變可能導致癌症，特別是肺癌和腎癌。

各種癌症的生物標記

癌症	Target Protein	品號	應用	包裝
大腸癌,黑色素瘤,膀胱癌	BRAF	07-453	WB, IP	200 µg
		HPA001328	IHC	100 µl
		SAB5600047	IHC, ICC, WB	100 µg
大腸癌,胰腺癌	KRAS	HPA041345	IHC, IF, WB	100 µl
	KRAS+HRAS+NRAS	05-1072	IHC, WB	100 µg
胰腺癌	CDKN2A	SAB5300498	IHC, WB, ELISA	100 µl
	SMAD4	HPA019154	IHC, IF, WB	100 µl
		SAB1412182	WB, PLA, ELISA	100 µg
		ABE21	ICC, WB	100 µg
胃癌	HER2	SAB4500787	IHC, WB, ELISA	100 µg
		HPA001383	IHC, IF, WB	100 µl
	PIK3CA	SAB2701957	WB, IF, IHC	100 µl
		WH0005290M1	PLA, ELISA	100 µg

癌症	Target Protein	品號	應用	包裝
神經膠質瘤	NTRK3	SAB5300229	WB, IHC, ELISA	100 µl
	IDH1	SAB4200548	WB	200 µl
		SAB4200592	IF, IP	200 µl
		HPA035248	IHC, WB	100 µl
	IDH2	SAB2101125	WB	100 µl
黑色素瘤	NRAS	SAB4200778	IHC	100 µl
白血病	FLT3	SAB4500961	WB, ELISA	100 µg
	NPM1	HPA011384	IHC, IF, WB	100 µl
	TP53	SAB1406544	WB, IF	50 µg
		AV02055	WB, IHC	100 µl

NTRK	參與神經細胞的生長，幫助調節神經細胞的生長和發育的基因。涉及 NTRK 基因的融合可能導致多種組織發生癌症
IDH	參與細胞代謝的酵素。IDH1 和 IDH2 的突變可能導致異常代謝物的產生，從而促進癌症的發展，特別是在神經膠質瘤和一些血癌。
NRAS	NRAS基因負責編碼一種參與細胞訊號傳導的蛋白質，特別是控制細胞生長和分裂的蛋白質。異常NRAS 突變 最常見的是黑色素瘤，但也可見於某些病例 白血病、甲狀腺癌和大腸癌。